

农作物病虫害情报

第六期

博罗县农业农村综合服务中心编

二〇二三年五月十二日

早稻迁飞性害虫的发生及防治

当前我县早稻正处于分蘖期，根据我中心植保部对水稻病虫害的监测，近期稻纵卷叶螟和稻飞虱的虫量在部分田块大幅度上升。据省气候中心预计，我省已进入强对流天气多发季节，5月有4次大范围降雨过程，5月底可能有热带系统外围环流天气影响我省，利于水稻“两迁”害虫持续迁入，现田间禾苗嫩绿的环境利于各种病虫害的发生，因此这段期间要关注田间虫情，对于达到防治指标的田块要及时用药挑治。

一、病虫害发生动态

稻纵卷叶螟：赶蛾情况，5月5日一般30头/亩；5月10日一般2200头/亩，最高的5500头/亩，田间暂无发现稻纵卷叶螟卷叶和幼虫。稻飞虱：田间调查，5月5日，稻飞虱平均200头/百丛；5月10日，稻飞虱平均500头/百丛，最高1200头/百丛，以低龄若虫为主。

二、防治意见

迅速查田，发现达到防治指标（稻飞虱 1000 头/百丛以上，稻纵卷叶螟幼虫 40 头/百丛以上）的应及时防治，稻纵卷叶螟最适防治时间是 5 月 16—18 日。防治稻纵卷叶螟和兼治钻蛀性螟虫可选用氯虫苯甲酰胺、乙基多杀菌素、阿维菌素、苏云金杆菌等药剂。防治稻飞虱可选用吡蚜酮、啉啉虫胺、三氟苯嘧啶等药剂。