

博罗县农业农村综合服务中心

关于印发早稻中后期管理技术 指导意见的通知

各镇（街道）农林水综合服务中心：

当前我县早稻陆续进入孕穗抽穗期，为进一步做好早稻田间管理，夺取粮食增产丰收，现将《早稻中后期管理技术指导意见》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。今后一段时间是我县早稻产量形成关键时期，如遇技术难题或病虫害新发、突发、暴发及遭受自然灾害等紧急情况，请核实情况后第一时间逐级上报，以便及时开展技术指导，确保早稻生产安全。

附件：早稻中后期管理技术指导意见

博罗县农业农村综合服务中心

2023年6月6日



附件：

早稻中后期管理技术指导意见

为了持续增强我县粮食生产能力，确保我县粮食生产稳定。现就加强早稻中后期田间科学管理，提出以下技术指导意见，供各镇（街道）农林水综合服务中心及广大种植户参考。

一、科学施肥

因部分早稻抛插秧迟，秧苗素质差，建议在施足基肥的基础上，加强肥水管理，特别是抓好平衡肥的施用，以促进禾苗早生快发，迅速搭起丰产的禾架。重点抓好以下措施：

一是适当补施长粗肥。早稻抛秧后 20-25 天或杂交稻亩苗数达 18 万、优质稻达 22 万时，要适当补施长粗肥（平衡肥），亩施尿素 3 公斤混氯化钾 7.5 公斤，如用复合肥可亩施 7.5-10 公斤。此次肥要视天气、地方和禾苗长相而科学施用，如禾色太过浓绿，可单施磷、钾肥，以稳禾架。够苗后要抓好露晒田工作，使叶色顺时转赤，架构强壮骨架，增强植株抗病能力。

二是巧施幼穗分化肥。在幼穗分化初期（第二次枝梗和颖花原基分化期），也就是抛后约 40 天左右，在抓好露晒田，叶色退赤，晴天时应及时施用穗肥，亩施尿素 4-5 公斤、氯化钾 5-7.5 公斤，如要用复合肥可亩施通用复合肥 10-12.5

公斤，如果叶色退赤不明显或阴雨天气，应减少氮素施用或分次减量施用穗肥。

三是根外追施壮粒肥。后期群体适中，叶色偏淡的稻田，齐穗时围绕养根保叶的原则，搞好根外追肥工作，要求在齐穗后亩用磷酸二氢钾 150 克加优质尿素 500 克兑水 75 公斤喷施，或用其它含微肥的叶面肥进行喷施，有利于提高结实率，增加粒数和粒重。

二、科学用水

抛秧后要浅水促分蘖以利生根回青，够苗时(亩苗数达到计划穗数的 80%时)要及时进行排水露晒田，以控制无效分蘖的发生，并促使幼穗分化二期顺时转赤，从而增强稻体抗病能力；幼穗分化后期要实行以湿润为主的平衡灌溉的原则，湿润长胎，壮根保叶，提高光合同化率；早稻后期不宜过早断水，以免影响结实率和千粒重，可于收获前一周灌一次跑马水，自然落干，以促进成熟，并便于收获和干燥。

三、综防病虫

采用“综合防治，以防为主”的植保方针，中后期重点防治穗颈瘟和纹枯病以及钻蛀性螟虫、稻飞虱、稻纵卷叶螟等病虫害，要密切注意病虫测报，及时施药防治。在施药防治病虫时要选用高效低毒低残留农药，确保我县稻米品质的提高和质量安全。

四、防灾减灾技术措施

(一) 龙舟水(涝害)

预防措施:

1. 做好水利工程，提高抗涝能力；
2. 加强水稻栽培管理，提高抵抗能力。

补救措施:

1. 抢排积水。有条件的应该当天排水，先排高田，使叶尖尽早露出水面。如是阴天可一次性排干水，如是高温烈日天气，不可一次排干水，要保留适当水层，分步排水，防止禾苗突然失水死亡；

2. 及时清理稻田、洗苗、扶苗或改种。退水后及时清理稻田的垃圾，防止垃圾堆积在稻田影响耕作、影响禾苗恢复生长；有条件的可在退水时及时清洗稻叶上泥沙。如果淹水时间过长，禾苗受损失收，要及时进行改种；

3. 及时补施速效肥。增施速效肥，促进水稻生长发育。由于受淹后水稻根系吸收能力差，施肥时要采用“少吃多餐”的方法，不可一次施肥太多。同时，还可以叶面喷施磷酸二氢钾等叶面肥；

4. 及时防治病虫鼠害。水稻受淹后叶片损伤，病菌、害虫容易侵入，要及时防治。同时，水灾过后，老鼠特别猖獗，为害特别重，要及时做好防鼠工作。

(二) 台风(倒伏)

预防措施:

1. 选用抗倒品种；
2. 应用水稻“三控”施肥技术；
3. 做好中期晒田。

补救措施：

1. 排涝降渍促恢复。台风前应排水降低田间水位，灾后尽快排除田间积水，减轻渍涝对水稻生长的影响。倒伏稻田应及时扶苗洗苗，恢复叶片正常光合机能，促进植株恢复生长；

2. 科学追肥促生长。退水后 3-5 天追肥，灾后生长偏弱的稻田，适量追施速效氮肥，或采用磷酸二氢钾加少量尿素均匀喷施，加快植株恢复生长；

3. 严控病虫降危害。加强水稻病虫的监测预警和适时防治。以预防水稻细菌条斑病、白叶枯病以及稻飞虱为主。台风前和台风后及时用药全面预防，防止病虫害流行危害。